

Rouxinol-grande-dos-caniços *Acrocephalus arundinaceus*

Chinchafães, Pinta-ró-ró

Estatuto de conservação em Portugal – Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Possui uma ampla área de distribuição que se estende da Península Ibérica e Marrocos até ao Japão, com uma área de descontinuidade na Ásia central. As aves europeias e da Ásia ocidental invernam na África subsaariana, enquanto as da Ásia oriental passam o inverno no sudeste Asiático.

Distribuição em Portugal Continental – Ocorre de forma localizada no sul do país e no litoral centro.

Fenologia na área de estudo – Estival.

Situação na área de estudo – Possui uma área de distribuição fortemente condicionada pela disponibilidade de habitat favorável. Esta ave frequenta zonas húmidas com vegetação palustre, não surpreendendo que as maiores densidades se tenham registado junto às lagoas de Santo André e Melides e na ribeira de Moinhos. Ocorre ainda nas valas dos arrozais da parte norte da área de estudo e na lagoa Formosa perto do Carvalhal e mais a sul na ribeira da Carrapateira e no paul de Budens. Trata-se de uma espécie localmente pouco comum, enquanto nidificante.

Não foi registado na migração outonal provavelmente porque é pouco conspícuo durante este período em que cessa a sua atividade vocal, e porque é um migrador precoce que abandona os locais de cria a partir de julho, sendo já escasso na segunda quinzena de agosto.