

## **Rouxinol-pequeno-dos-caniços *Acrocephalus scirpaceus***

Rouxinol-dos-caniços, Bunheiro, Chiadeira

**Estatuto de conservação em Portugal** – Quase ameaçado.

**Estatuto de conservação mundial** – Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** – Nidifica por quase toda a Europa, excepto nas zonas mais setentrionais, no norte de África e nalguns sectores da Ásia. Inverna na África subsaariana.

**Distribuição em Portugal Continental** – Ocorre ao longo de todo o litoral durante a época de criação, penetrando mais para o interior no Ribatejo e no Alentejo. Durante a migração surge por todo o país.

**Fenologia na área de estudo** – Estival e migrador de passagem.

**Situação na área de estudo** – É uma espécie que apresenta uma distribuição muito condicionada pela disponibilidade de habitat favorável, frequentando sobretudo zonas húmidas com vegetação palustre, sobretudo caniçais. Assim, ocorre principalmente a norte de Sines, onde encontra habitat adequado em locais como a ribeira de Moinhos, as lagoas de Santo André e Melides e a extensa rede de valas com caniço que cruza as zonas de arrozal da zona da Comporta. A sul de Sines ocorre pontualmente em pequenos açudes ou valas, com destaque para a elevada densidade observada na lagoa de Budens. Como nidificante, é uma espécie pouco comum.

No outono esta ave foi observada em grande medida nos mesmos locais. Porém na migração pode ser registada afastada dos seus habitats preferenciais, ocorrendo também em zonas de matos. A sua passagem foi mais frequente no final de agosto do que no final de setembro, sendo igualmente pouco comum como migradora de passagem.