

Arrábio *Anas acuta*

Pato-fogueteiro, Rabijunco, Rabo-de-alfinete

Estatuto de conservação em Portugal Continental - Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - Ocorre como reprodutor da Islândia à Sibéria oriental passando pela Escandinávia, em latitudes elevadas e, de uma forma esparsa, nas ilhas Britânicas e no leste europeu e Próximo Oriente. Inverna na Europa, desde as ilhas Britânicas e Países Baixos, aos países circum-mediterrânicos e África ocidental.

Distribuição em Portugal Continental - Invernante pouco comum, e migrador de passagem, que ocorre sobretudo em zonas estuarinas e lagoas costeiras. Até há alguns anos atrás, os maiores efetivos eram contabilizados no estuário do Sado, com números também significativos na ria Formosa, no estuário do Tejo e na lagoa de Santo André.

Fenologia na área de estudo - Invernante.

Situação na área de estudo - Durante a recolha de dados sistemática foi registado na passagem outonal e no inverno, tendo sido observado nas lagoas de Melides e de Santo André em números baixos. No entanto, é conhecida a invernada em efetivos superiores aos registados neste inverno de 2011. O facto das condições hídricas terem sido mais favoráveis noutras áreas tradicionais de ocorrência, poderá ser a causa deste resultado. Deve-se, assim, assumir que o arrábio é mais abundante, tanto na migração outonal como no inverno, do que o espelhado nos mapas.

A distribuição espacial apresentada deverá estar relativamente próxima da realidade, com os principais locais de presença a estarem restringidos às lagoas costeiras de Santo André, Melides, Sancha e ribeira de Moinhos, assim como ao estuário do Sado. Trata-se de uma invernante regular e pouco comum.