

## **Pato-colhereiro *Anas clypeata***

Bica-larga, Pato-trombeteiro, Pintalhão

**Estatuto de conservação em Portugal Continental** - Pouco preocupante como invernante e em perigo como reprodutor.

**Estatuto de conservação mundial** - Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** - Reproduz-se de forma esparsa na Europa, e num contínuo desde as Ilhas Britânicas e Escandinávia à Sibéria oriental. As populações migradoras invernam na Europa, Mediterrâneo, África oriental e Ásia central.

**Distribuição em Portugal Continental** - Invernante comum, sobretudo em albufeiras e açudes do Alentejo, nos estuários do Tejo e Sado, e nas rias Formosa e de Aveiro. Estas zonas húmidas concentram grande parte da população portuguesa. Ocorre também um pouco por todas as zonas estuarinas, assim como em lagoas costeiras, sendo escasso nas zonas húmidas do interior centro e norte. A reprodução é bastante irregular e escassamente registada, tendo ocorrido em algumas albufeiras do Alentejo, na lagoa dos Salgados e possivelmente, no baixo Mondego.

**Fenologia na área de estudo** - Invernante e migradora de passagem.

**Situação na área de estudo** - Foi registada em todas as épocas do ano, nas lagoas de Santo André e Melides, tendo também sido observada no inverno junto da península da Carrasqueira. É claramente uma espécie mais abundante nos períodos de migração outonal e de inverno, atribuindo-se os registos de primavera a invernantes retardatários mais que a prováveis reprodutores.

A distribuição apresentada deverá estar bastante próxima da realidade, com a área principal de ocorrência a restringir-se às lagoas de Santo André e de Melides e ao estuário do Sado. Alguns efetivos estão apenas associados à passagem outonal, enquanto outros apenas ocorrem já com o decorrer da época de inverno, associando-se estes movimentos, provavelmente, a uma tentativa de escaparem a condições meteorológicas demasiado adversas nas suas áreas tradicionais de invernada na Europa central e do norte.