

Petinha-ribeirinha *Anthus spinoletta*

Cia, Cião, Sombria

Estatuto de conservação em Portugal Continental – Em perigo enquanto nidificante e pouco preocupante enquanto invernante.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – A área de distribuição é bastante fragmentada, estendendo-se pelas regiões montanhosas da Europa, da Turquia, pelo Cáucaso e Irão, e pelas montanhas da Ásia central. Parte da população é migradora, invernando nas zonas baixas da Europa circum-mediterrânica e ocidental, norte de África, Médio Oriente e sudeste Asiático.

Distribuição em Portugal Continental – Como reprodutora, ocorre unicamente na serra de Montesinho. No inverno, esta espécie distribui-se de forma mais alargada, podendo ser encontrada em arrozais, várzeas agrícolas, culturas de regadio alagadas, lameiros, salinas, pauis e mesmo em algumas zonas estuarinas. Podem também ser encontradas em zonas serranas com matos rasteiros.

Fenologia na área de estudo – Invernante.

Situação na área de estudo – Foi unicamente registada durante o período de inverno, com observações concentradas em zonas húmidas da metade norte da área considerada. Ocorreu sobretudo nas áreas de arrozais entre o Carvalhal e a península da Carrasqueira, sendo nesta última que se verificaram as maiores abundâncias. Foi também registada na lagoa de Melides, estuário do Mira, e em pastagens alagadas perto de Cabeço da Cabra.

Apesar de ser uma espécie pouco comum, admite-se que possa ocorrer em mais algumas zonas húmidas da área estudada, e mesmo durante as passagens migratórias.