

Andorinhão-preto *Apus apus*

Aivão, Catavento, Ferreiro, Gaivão, Guincho, Zilro, Zirro

Estatuto de conservação em Portugal Continental - Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - Reproduz-se em grande parte da Europa, no extremo noroeste de África, partes do Médio Oriente, e em grande parte da Ásia central. É uma ave migradora que inverte na África a sul do equador.

Distribuição em Portugal Continental - Distribui-se de norte a sul do território continental, sendo mais abundante na metade norte. Utiliza sobretudo habitats urbanos, mas também pode ocorrer em áreas com escarpas fluviais, serras, costa rochosa e habitats florestais. Ocorre apenas durante o período estival e passagem outonal.

Fenologia na área de estudo - Estival e migrador de passagem.

Situação na área de estudo - Tratando-se de uma nidificante estival, o período de maior frequência de ocorrências é a primavera. Está também presente no período outonal, muito embora em menor frequência, provavelmente por se tratar de uma migradora que abandona os locais de reprodução relativamente cedo no ano.

A faixa entre Sines e o cabo Sardão é aquela que apresentou os valores mais elevados de abundância. A distribuição não é uniforme ao longo da área considerada, revelando alguma apetência para concentrações em campos agrícolas, onde se alimenta.

Recolheu-se na bibliografia existente uma observação de inverno, na região de Sagres. No entanto, admite-se que essa observação respeitará a um exemplar tardio, ainda em passagem para África, mais que a um puro invernante.