

Águia-de-bonelli *Aquila fasciata*

Águia-perdigueira

Estatuto de conservação em Portugal Continental – Em perigo.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Distribui-se pelo sudeste asiático, subcontinente indiano, Médio Oriente e pela região circum-mediterrânica.

Distribuição em Portugal Continental – Ocorre, enquanto reprodutora, pelo Alto Douro e afluentes próximos, pela secção raiana do Tejo e afluentes próximos, serras da região central, bacia do Guadiana e serras do sudoeste alentejano e algarvias. Está ainda presente na região Oeste, e próximo dos estuários do Tejo e Sado.

Fenologia na área de estudo – Residente e migradora de passagem.

Situação na área de estudo – Neste Atlas, esta espécie está restringida ao extremo sudoeste, onde se verifica a presença de dois territórios reprodutores, o que explica a acentuada sobreposição de áreas de distribuição na primavera e no inverno. Neste caso, as áreas ocupadas apresentadas dizem respeito a zonas de alimentação, dado que os ninhos se situam já fora da área estudada, nas zonas da Bordeira e Barão de S. João.

Outros casais ocorrem na vizinhança da área considerada, pelo que se prevê que a ocorrência desta espécie possa existir mais a norte, embora de forma pontual. Não se verificou a ocorrência de reprodução em falésias costeiras, situação que existia nesta região há algumas décadas atrás.

No outono registou-se a presença de exemplares migradores ou em movimentos dispersivos, na região de Sagres, seguindo uma rota em tudo semelhante à de outras espécies de aves planadoras.