

Mocho-galego *Athene noctua*

Mocho, Ave-gatinhas, Chio, Papagaio-saloio

Estatuto de conservação em Portugal – Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Ocorre na maior parte da Europa, com exceção da Escandinávia, Finlândia e norte da Rússia. A sua área de distribuição estende-se ainda pelo norte de África, Médio Oriente e maior parte da Ásia.

Distribuição em Portugal Continental – Ocorre em todo o território, sendo claramente mais comum na metade sul do país. É particularmente abundante em algumas zonas do interior do Alto e Baixo Alentejo, e do litoral algarvio.

Fenologia na área de estudo – Residente.

Situação na área de estudo – Distribui-se por toda a área de estudo, em zonas com locais de nidificação adequados (cavidades em árvores, montes de pedras, muros ou ruínas) e habitats de caça favoráveis, com vegetação herbácea relativamente curta.

É mais abundante em áreas de mosaico agrícola com montados, nas zonas da lagoa de Santo André, várzea da ribeira das Fontainhas e Fonte de Mouro, e nas áreas abertas com predominância de pousios e pastagens existentes a norte de Porto Covo ou perto do Brejão, Rogil, Sagres e Vila do Bispo.

Frequentemente ocorre em zonas periurbanas, em que existam ruínas ou edifícios agrícolas onde nidificar. Foi também detetado em pequenas manchas de habitat favorável, em zonas ocupadas predominantemente por florestações.