

## **Bufo-real *Bubo bubo***

Corujão, Mocho-real

**Estatuto de conservação em Portugal** – Quase ameaçado.

**Estatuto de conservação mundial** – Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** – Distribui-se pela região paleártica, ocupando a maioria da Europa e da Ásia. Encontra-se ausente apenas das regiões mais setentrionais, subcontinente indiano, sudeste asiático, Ilhas Britânicas e partes da Europa central, Escandinávia e Médio Oriente.

**Distribuição em Portugal Continental** – Distribui-se por uma boa parte do território nacional, embora de forma descontínua. É mais frequente em zonas acidentadas e pouco perturbadas, nomeadamente no interior, mas também no Minho, Centro e costa sudoeste.

**Fenologia na área de estudo** – Residente.

**Situação na área de estudo** – Trata-se de uma rapina noturna rara na área estudada, e de distribuição localizada. Foi detetada a presença do bufo-real em quatro quadrículas, com recurso à recolha de dados sistemáticos ou suplementares, correspondendo seguramente esta distribuição a 3 ou 4 territórios. A presença desta espécie faz-se notar sobretudo na faixa mais a sul, onde encontra melhores condições para a nidificação, como sejam a presença de zonas pouco perturbadas e vales com matos e encostas rochosas ou pequenas escarpas.

A realização de inquéritos às zonas de caça da área de estudo revelou a possível presença de bufo-real numa área mais alargada que aquela determinada pelos trabalhos de campo. De facto, e de acordo com aqueles dados, a presença de bufo-real poderá estender-se até algumas áreas a norte de Sines, nomeadamente até à latitude de Melides.

O maior número de registos obtido no inverno corresponde ao período de maior detetabilidade da espécie, uma vez que é nos meses de novembro e dezembro que os bufos-reais iniciam a marcação dos seus territórios, vocalizando com maior frequência.