

## **Pilrito-de-peito-preto *Calidris alpina***

Pilrito-comum

**Estatuto de conservação em Portugal Continental** - Pouco preocupante.

**Estatuto de conservação mundial** - Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** - Cria nas regiões árticas e subárticas da Eurásia, Gronelândia e América do Norte, assim como nos países bálticos e Ilhas Britânicas. Sendo uma ave migradora, inverte nas costas americanas do Pacífico e Atlântico até à latitude do México, na Europa e África ocidental, no Sahel, Médio Oriente, subcontinente Indiano e sudeste asiático.

**Distribuição em Portugal Continental** - Espécie sobretudo presente durante o inverno, ocorrendo ao longo da faixa costeira, em zonas estuarinas e lagoas costeiras. Também pode ser observada em praias e na costa rochosa de baixa altura. Durante as passagens primaveril e outonal, pode ser observada em zonas húmidas do interior.

**Fenologia na área de estudo** - Invernante e migradora de passagem.

**Situação na área de estudo** - Limícola que ocorre sobretudo na passagem outonal e durante o inverno, e de forma bastante localizada. A sua presença foi registada em locais como o estuário do Mira, as lagoas de Santo André e Melides, e o estuário do Sado (penínsulas da Carrasqueira e de Troia, e caldeira de Troia). Também foi registada a ocorrência na ribeira de Aljezur e na ribeira da Carrapateira, neste último local somente na passagem outonal.

Na primavera a presença desta espécie só foi detetada na lagoa de Melides e junto à península da Carrasqueira. Estas observações deverão dizer respeito a aves na passagem pré-nupcial.

Esta espécie utilizou principalmente habitats como as zonas de vaza estuarinas, sapal, lagoas costeiras, áreas arenosas na foz de alguns rios e ribeiras.