

## **Cagarra *Calonectris diomedea***

Pardela-de-bico-amarelo; Cagarro

**Estatuto de Conservação em Portugal Continental** - Vulnerável.

**Estatuto de Conservação mundial** - Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** - Ave marinha por excelência, ocorrendo em terra exclusivamente para se reproduzir. Nidifica em ilhas do Mediterrâneo, e em algumas zonas temperadas do Atlântico Norte, como os arquipélagos da Madeira, Canárias, Açores e Berlengas. Durante o inverno boreal, as aves das colónias atlânticas distribuem-se ao largo da costa da América do Sul e do sul de África. Também frequentam áreas situadas mais para norte, passando regularmente junto da costa leste dos Estados Unidos. Alguns indivíduos do Mediterrâneo invernam na área das Canárias.

**Distribuição em Portugal Continental** - Distribui-se ao longo da costa continental portuguesa, sendo facilmente observada a partir da costa. No outono (setembro e outubro) é possível observar aves em grande número em migração. Nidifica apenas na Berlenga e nos Farilhões.

**Fenologia na área de estudo** - Migrador de passagem.

**Situação na área de estudo** - Foi registada a presença desta espécie no outono e ao largo de Sines e na zona da Carrapateira. Na primavera esta espécie foi observada na zona da Carrapateira e na península de Sagres. Neste último local é observada regularmente durante todo o período de permanência no nosso território.

Esta espécie apenas pode ser observada sobre o mar, admitindo-se a sua ocorrência ao largo de quase toda a faixa litoral considerada. A presença da cagarra faz-se notar sobretudo entre a primavera e a passagem outonal.