

## **Trepadeira-do-sul *Certhia brachydactyla***

Amarinhadeira, Subideira, Tropa, Trepadeira-comum, Tropa-pinheiros

**Estatuto de conservação em Portugal** – Pouco preocupante.

**Estatuto de conservação mundial** – Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** – Distribui-se por toda a Europa ocidental (com exceção das Ilhas Britânicas) e central, incluindo os Balcãs e a Turquia. Ocorre ainda no Cáucaso e no Magrebe.

**Distribuição em Portugal Continental** – Pode ser encontrada em todo o território de Portugal continental.

**Fenologia na área de estudo** – Residente.

**Situação na área de estudo** - Esta trepadeira é comum e bem distribuída por toda a área de estudo, estando ausente apenas das quadrículas essencialmente desarborizadas ou dominadas por matagais cerrados. Ocorre tanto em pinhal como em montado e mesmo em mosaicos agrícolas com olivais, pomares ou sebes. É particularmente abundante nos pinhais e montados entre Troia e Sines (principalmente próximo de Melides e Santo André), e da zona da Bordeira. Prefere montados ou pinhais alternados com sobreiros aos pinhais puros.

Não se registaram diferenças significativas na distribuição e abundância desta espécie ao longo do ciclo anual, evidenciando o seu carácter residente.