

Borrelho-pequeno-de-coleira *Charadrius alexandrinus*

Areeiro, Corricão, Cuco-curo, Pássaro-das-areias

Estatuto de conservação em Portugal – Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Este borrelho possui uma área de distribuição muito alargada, que se estende ao longo da costa atlântica desde a Dinamarca até à Península Ibérica, bacia do Mediterrâneo e ao longo de uma faixa desde a Europa de leste até ao oriente asiático. Nidifica ainda na costa ocidental de África, mar Vermelho, golfo Pérsico, sul da Índia e Sri Lanka e nalguns locais do sudeste asiático. Possui também uma ampla distribuição na América do Norte e central. As populações migradoras invernam na África subsaariana a norte do Equador, sudeste asiático e costa do Pacífico da América do Sul.

Distribuição em Portugal Continental – Distribui-se por toda a faixa litoral, sendo mais comum no Sul.

Fenologia na área de estudo – Residente e invernante.

Situação na área de estudo – O borrelho-de-coleira-interrompida possui uma distribuição localizada na área de estudo. Ocorre principalmente no litoral arenoso com sistemas dunares, aparecendo as maiores concentrações junto às lagoas costeiras de Melides e Santo André, paul de Budens e também na foz da ribeira de Moinhos e do rio Mira. O facto de se terem obtido mais registos no inverno, indicia que a população residente é reforçada neste período por efetivos migradores provindos do norte da Europa. Trata-se de uma espécie pouco comum na área do Atlas.