

## **Borrelho-grande-de-coleira *Charadrius hiaticula***

Colado, Fradinho, Guleira

**Estatuto de conservação em Portugal** – Pouco preocupante.

**Estatuto de conservação mundial** – Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** – A distribuição desta limícola, como nidificante, compreende as zonas mais a norte dos continentes europeu e asiático incluindo a Islândia e a Gronelândia. Fora do período reprodutor ocorre ao longo da costa atlântica da Europa e nalguns locais do Mediterrâneo. Distribui-se também por todo o continente africano (com exceção das zonas desérticas), pela costa do mar Vermelho, golfo Pérsico, parte sul do mar Cáspio, costa sudeste da Índia e Sri Lanka.

**Distribuição em Portugal continental** – Em Portugal continental observa-se apenas fora do período reprodutor, como invernante e migrador de passagem. Ocorre ao longo de toda a faixa costeira, podendo também ser visto, embora em menor número, em zonas húmidas do interior.

**Fenologia na área de estudo** – Invernante e migrador de passagem.

**Situação na área de estudo** – Apesar de não nidificar na área de estudo, esta ave pode ser observada durante todo o ano, já que alguns indivíduos (provavelmente imaturos) permanecem no nosso país durante a primavera. Foi observada em diversos tipos de habitats alagados, incluindo estuários, arrozais, praias e margens de lagoas. Os arrozais da parte norte da área de estudo são muito frequentados durante todo o ano. Na primavera registou-se a sua presença na lagoa de Melides e no estuário do Mira. No inverno, crescem a estas áreas a lagoa de Santo André, a ribeira de Moínhos, a ribeira de Aljezur e algumas praias e dunas.

Na migração pós-nupcial, foi registada mais frequentemente em setembro do que em agosto. Neste período, os arrozais da zona do Sado e o estuário do Mira, são os locais onde se concentram maior número de indivíduos, observando-se também aves na lagoa de Melides e em praias e estuários ao longo da costa.