

Cegonha-branca *Ciconia ciconia*

Cerangonha, Rainha-dos-arrozais

Estatuto de conservação em Portugal Continental - Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - Como reprodutora distribui-se pela Europa Central e do sul, Turquia, Médio Oriente, Cáucaso, Uzbequistão, Cazaquistão e norte do Afeganistão. Existe também uma população residente na África do Sul. Com exceção desta população e da que ocorre no sul da Península Ibérica, as restantes são migradoras, invernando na África subsaariana e no subcontinente indiano.

Distribuição em Portugal Continental - Nidifica em praticamente todo o território a sul do Tejo e Ribatejo, com exceção dalguns locais nas serras algarvias. Ocorre ainda, embora com menor abundância na zona raiana das Beiras e em Trás-os-Montes. A sua distribuição no litoral a norte de Lisboa é muito fragmentada, encontrando-se praticamente restrita ao Baixo Mondego, ao Baixo Vouga e à região de Leiria.

Fenologia na área de estudo - Estival e residente, alguns indivíduos são invernantes.

Situação na área de estudo - A cegonha-branca foi registada em todas as épocas amostradas. No inverno e na primavera ocorre em quase toda a extensão da área de estudo, sobretudo nos arrozais da península da Carrasqueira, nas lagoas de Santo André e Melides e junto ao cabo Sardão. Foi confirmada a sua nidificação em várias quadrículas, nomeadamente nas falésias junto ao cabo Sardão e a sul deste. No outono, esta espécie concentra-se principalmente na zona da península da Carrasqueira e a norte da lagoa de Santo André.