

## **Tartaranhão-cinzento *Circus cyaneus***

Gavião-do-paul, Pilha-ratos, Tartalhão, Tartaranhão-azulado

**Estatuto de conservação em Portugal** - Em perigo como nidificante e vulnerável como invernante.

**Estatuto de conservação mundial** - Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** - O tartaranhão-cinzento apresenta uma distribuição alargada que abrange grande parte do continente americano e da Eurásia. Na Europa ocorre principalmente na Península Ibérica e em França.

**Distribuição em Portugal Continental** - O tartaranhão-cinzento frequenta áreas de paisagens serranas abertas, com matos e com pastagens de altitude, searas de centeio e plantações jovens de resinosas. Esta espécie ocorre como nidificante apenas numa faixa estreita no extremo norte (serras do Alto Minho e Trás-os-Montes). No Inverno, apresenta uma distribuição alargada de norte a sul, sendo observada na maioria das vezes no sul do país (Alentejo).

**Fenologia na área de estudo** - Invernante e migrador de passagem.

**Situação na área de estudo** - O tartaranhão-cinzento é uma invernante relativamente rara na área do Atlas, e foi detetada na zona da Comporta, nas planícies costeiras a sul de Sines e nas quadrículas adjacentes ao cabo Sardão e em Aljezur.

Na passagem outonal, foi detetado nos matos costeiros a sul do cabo Sardão e na zona de Sagres. Nesta área o tartaranhão-cinzento é mais frequente no final de setembro do que no final de agosto, por um lado porque é um migrador relativamente tardio na passagem pós-nupcial, e por outro lado porque alguns indivíduos invernam na zona de Sagres.