

Pombo-das-rochas *Columba livia*

Pombo-bravo

Estatuto de conservação em Portugal continental - Informação insuficiente.

Estatuto de conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - Ocorre em grande parte da América do Norte, Europa, norte de África, Médio Oriente e subcontinente indiano. Foi ainda introduzido na Austrália, extremo oriental da China e em alguns arquipélagos polinésios. Parte das populações mundiais é de origem desconhecida ou introduzida.

Distribuição em Portugal continental - Ocorre praticamente em todo o território continental. As populações existentes possuem na atualidade uma elevada taxa de miscigenação com as variedades domésticas desta espécie. Algumas populações mantêm, no entanto, algum grau de pureza genética, nomeadamente aquelas que ocorrem em falésias costeiras, no Alto Douro e no Tejo Internacional e, possivelmente, na costa sudoeste.

Fenologia na área de estudo - Residente.

Situação na área de estudo - Bastante bem distribuída ao longo da área deste Atlas, ocorrendo em todas as épocas do ano. É sobretudo mais abundante na faixa litoral onde ocorrem zonas de falésias marítimas. Nas zonas urbanas observam-se bandos de grandes dimensões, mas que certamente dizem respeito a exemplares ferais ou domésticos. Parece ser mais abundante ao longo da península de Sagres, pelo menos na primavera e no outono. Aqui, ocorre nas falésias costeiras e nos adjacentes campos agrícolas e pastagens.

No inverno distribui-se de forma mais uniforme, no que toca às abundâncias estimadas, observando-se bandos de grandes dimensões junto a zonas húmidas como a lagoa de Santo André e os arrozais de Carvalhal/Torre. Uma vez mais, parte destes exemplares, senão todos, poderão dizer respeito a exemplares ferais ou domésticos.