

Codorniz *Coturnix coturnix*

Calcaré, Papalvo, Paspalha, Paspalhão, Tem-te-lá

Estatuto de conservação em Portugal – Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Enquanto reprodutora, a codorniz distribui-se por quase toda a Europa, Ásia central até à Mongólia, Médio Oriente e, de forma localizada, em África e na península Arábica. As aves das latitudes mais a norte invernam em África ou no subcontinente indiano.

Distribuição em Portugal Continental – Distribui-se por quase todo o território, sendo mais comum no sul.

Fenologia na área de estudo – Estival e invernante.

Situação na área de estudo – Durante o período reprodutor a codorniz não foi observada a norte da lagoa de Santo André. É mais abundante nas pastagens, pousios e campos agrícolas a sul de Sines, evitando as zonas florestadas e matagais densos. É pouco comum durante este período.

No outono e inverno é muito menos comum, tendo sido observada em poucos locais, destacando-se o Algarve como área de ocorrência mais regular. O facto de ser uma ave difícil de detetar sem ser pelo canto poderá ter dificultado a sua deteção fora do período reprodutor, altura em que reduz a sua atividade vocal.

Os dados obtidos através dos inquéritos realizados a zonas de caça na área de estudo indicam que a área de distribuição da codorniz deverá ser mais alargada que aquela determinada pelos resultados da recolha de dados sistemática, podendo ser quase contínua para sul do Carvalhal. Apesar dos dados dos inquéritos (que não especificavam a época do ano em que a espécie havia sido detetada) terem sido representados apenas no mapa referente à primavera, é possível, no entanto, que em algumas zonas da metade norte da área de estudo a codorniz ocorra sobretudo fora do período de reprodução.