

Torcicolo *Jynx torquilla*

Cabeça-de-cobra, Doudinha, Formigueiro, Gira-pescoço, Papa-formigas

Estatuto de conservação em Portugal – Informação insuficiente.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Distribui-se por uma ampla faixa que abrange praticamente toda a Europa continental, estendendo-se até ao Japão. Possui populações residentes nalguns locais do extremo sul da Europa e no Magrebe. As restantes populações são migradoras, invernando em África a sul do Saara, na Índia, sudeste asiático e ilhas mais meridionais do Japão.

Distribuição em Portugal Continental – Distribui-se de forma descontínua por todo o país.

Fenologia na área de estudo – Estival e migrador de passagem.

Situação na área de estudo – Como no resto do país, o torcicolo ocorre de forma muito localizada na área de estudo, sendo possível que a sua presença esteja subestimada devido aos hábitos discretos que dificultam a sua deteção.

Foi observado em áreas de montado ou montado alternado com pinhal na falda das serras que limitam a área de estudo a oriente, como é o caso da serra do Cercal. Registou-se também numa galeria ripícola na zona das Fontainhas, a norte de Melides.

No período de migração outonal observou-se exclusivamente na porção sul da área de estudo em matos e montados, junto à praia do Canal, na zona de Aljezur, e no vale da Vilarinha no Espinhaço de Cão. Tem sido também frequentemente detetado no outono na zona de Sagres. Neste período a probabilidade da presença desta ave estar subestimada é ainda maior, já que a sua atividade vocal é muito reduzida, o que acresce às dificuldades na deteção.