

Picanço-barreteiro *Lanius senator*

Barrete, Mata-frades, Pardal-real, Pica-porco

Estatuto de Conservação em Portugal – Quase ameaçado.

Estatuto de Conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Nidifica em torno do Mediterrâneo, estendendo a sua área de distribuição para oriente até ao Irão. Inverna a sul do deserto do Saara.

Distribuição em Portugal Continental – É uma ave de forte cariz mediterrânico, que ocorre em todo o sul do país e ao longo do interior norte.

Fenologia na área de estudo – Estival, migrador de passagem.

Situação na área de estudo - Na primavera está praticamente ausente de toda a área a norte de Sines, sendo na zona a sul de Aljezur que a sua distribuição é mais contínua e onde se registam as maiores abundâncias. Encontra-se também relativamente bem distribuído de Porto Covo à Zambujeira do Mar. Ocorre em bosques abertos, tanto em montados como olivais ou pomares e também nas sebes de mosaicos agrícolas e em matos.

No outono foi registado quase exclusivamente na primeira época de amostragem, com registos bastante espalhados por toda a área, não evidenciando nenhuma zona particularmente importante como corredor migratório ou local de concentração. Neste período, o picanço-barreteiro aumenta a diversidade de biótopos de ocorrência, tendo sido detetado também em pinhais.