

## **Gaivota-de-audouin *Larus audouinii***

**Estatuto de conservação em Portugal Continental** - Vulnerável.

**Estatuto de conservação mundial** - Quase ameaçada.

**Distribuição mundial** - Distribui-se de forma circum-mediterrânica, sobretudo na margem europeia, invernando no norte e noroeste de África, Mediterrâneo ocidental, e África ocidental. Existe também uma pequena população invernante no mar Egeu.

**Distribuição em Portugal Continental** - Reproduz-se unicamente no extremo sudeste de Portugal continental, nomeadamente no sapal de Castro Marim e na ria Formosa. No período pós-reprodutor pode ser encontrada praticamente em todo o sotavento algarvio e, em menor abundância, no barlavento. Alguns exemplares invernam no Algarve, uma vez mais com preponderância para o sotavento.

**Fenologia na área de estudo** - Migrador de passagem.

**Situação na área de estudo** - Sendo uma gaivota de ocorrência rara na área do Atlas, não surpreende que apenas tenha sido registada em duas áreas e em números bastante reduzidos. Assume-se que a presença durante a passagem outonal deverá ser regular, mas escassa, e que a observação de exemplares em migração se concentra, em grande medida, em torno da península de Sagres. A presença no extremo sul da área considerada reflete exatamente a passagem de alguns indivíduos pela ponta de Sagres e pelo cabo de São Vicente.

Foi também observado um exemplar na praia do Carvalhal (Zambujeira do Mar), durante o inverno. Ainda assim, a presença de aves invernantes na área estudada deverá ser ocasional e com efetivos reduzidos.