

Gaivota-de-patas-amarelas *Larus michahellis*

Gaivota-argêntea, Gaivota-de-manto-cinzento, Gaivota-de-prata

Estatuto de conservação em Portugal – Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Nidifica na Europa do Sul, norte de África, ilhas da Macaronésia, Médio Oriente, mar Negro e golfo Pérsico. Fora do período reprodutor expande a sua área de distribuição a toda a Europa ocidental, central e do sul e à costa ocidental de África.

Distribuição em Portugal continental – Distribui-se ao longo de todo o litoral, penetrando por vezes em estuários e albufeiras do interior. Nidifica sobretudo no litoral rochoso a sul do cabo Carvoeiro, estando localizada nas Berlengas uma percentagem significativa da população nacional.

Fenologia na área de estudo – Residente.

Situação na área de estudo – Esta gaivota é muito comum e distribui-se por toda a orla costeira da área de estudo, sendo muito mais abundante no litoral rochoso a sul de Sines. Nidifica em falésias e em ilhéus, sendo também observada a alimentar-se ou em repouso nos portos de pesca, em praias de areia, lagoas costeiras e estuários. Na primavera, as observações realizadas fora das áreas de nidificação dizem respeito sobretudo a indivíduos jovens, não-reprodutores. No inverno e outono a sua distribuição não difere muito da registada na primavera.