

## **Alcatraz-comum *Morus bassanus***

Facão, Ganso-patola, Mascato

**Estatuto de conservação em Portugal Continental** - Pouco preocupante.

**Estatuto de conservação mundial** - Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** - Cria em colónias espalhadas por alguns locais em ambos os lados do Atlântico Norte, nomeadamente nas ilhas Britânicas, França, Islândia, Noruega e Canadá. Grande parte da população migra para latitudes mais baixas, estendendo-se a área de invernada até à costa marroquina e Mediterrâneo ocidental, e à Florida e golfo do México na costa americana.

**Distribuição em Portugal continental** - Ocorre em ambiente marinho, ao longo de toda a faixa litoral de norte a sul. É particularmente abundante na passagem outonal e durante o inverno.

**Fenologia na área de estudo** - Invernante e migrador de passagem.

**Situação na área de estudo** - O alcatraz-comum é facilmente observável em deslocação ou em alimentação ao longo de toda a faixa costeira da área de estudo. Apesar de estar presente ao longo de todo o ano, as suas principais épocas de ocorrência são o inverno e o período de migração outonal, o que se reflete nos mapas apresentados. Na primavera, a sua presença faz-se sobretudo sentir através dos contingentes de aves jovens que permanecem nos seus locais de invernada, sem retornarem às colónias nos seus primeiros anos de vida.

Os valores de abundância aqui apresentados não traduzem a real distribuição e densidades desta ave marinha, mas antes a presença mais próxima da costa, ou mesmo a passagem de alguns exemplares terra adentro, dado que a metodologia de contagem sistemática de aves marinhas apenas incidiu sobre exemplares que foram registadas no ambiente terrestre.

Durante o período migratório é bastante abundante, com a passagem de milhares de aves perto da costa.