

## **Britango *Neophron percnopterus***

Abutre-de-egito, Almocreve-dos-cucos, Brita-ossos, Corvinho-branco

**Estatuto de conservação em Portugal Continental** - Em perigo.

**Estatuto de conservação mundial** - Em perigo.

**Distribuição mundial** - Trata-se de uma espécie que ocupa uma área alargada, com populações isoladas em Cabo Verde e nas ilhas Canárias, estendendo-se depois pela África ocidental até Marrocos. Os núcleos mais importantes ocorrem na África oriental, península Arábica e subcontinente indiano. Existem ainda populações fragmentadas em Angola, Namíbia, Mediterrâneo e montanhas asiáticas.

**Distribuição em Portugal Continental** - Distribui-se, enquanto reprodutor, pelos vales do Alto-Douro e Tejo Internacional e respetivos afluentes. Durante a migração outonal ocorrem aves jovens na península de Sagres e seu entorno, principalmente entre setembro e novembro.

**Fenologia na área de estudo** - Migrador de passagem.

**Situação na área de estudo** - Como esperado, esta ave de rapina está presente apenas durante a passagem migratória pós-reprodutora. Foi observada apenas nas áreas a sul de Aljezur, com especial ênfase para a região entre a península de Sagres e o Burgau. A região de Sagres corresponde ao principal ponto de concentração de britangos migradores, com algumas dezenas de aves a cruzar a área todos os anos no final do verão e outono. É pouco provável a sua presença durante a migração primaveril.