

Painho-de-cauda-forcada *Oceanodroma leucorhoa*

Estatuto de conservação em Portugal Continental - Não considerado.

Estatuto de conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - Reproduz-se no arco do oceano Pacífico do hemisfério norte, do Japão ao México, e em ambos os lados do Atlântico Norte, nas latitudes mais setentrionais, desde o nordeste americano à Noruega e norte das ilhas Britânicas. Inverna em águas equatoriais e tropicais dos oceanos Atlântico e Pacífico.

Distribuição em Portugal Continental - Ocorre exclusivamente em meio marinho. É pouco comum, sendo mais frequentemente observado junto a promontórios, durante a migração.

Fenologia na área de estudo - Migrador de passagem.

Situação na área de estudo - Foi registado unicamente ao largo do cabo de São Vicente, fora dos trabalhos de recolha sistemática de dados. Habitualmente, apenas pode ser observado durante a passagem outonal e parte do período invernal, entre meados de outubro e meados de janeiro. Dependendo das condições de mar e vento, assim a ocorrência desta espécie se pode tornar mais ou menos frequente, dado que muitas vezes a sua aproximação à linha de costa está associada à passagem de temporais.

Embora a presença deste painho tenha sido registada numa única quadrícula, sabe-se que ocorre ao longo de praticamente toda a faixa costeira considerada, existindo registos mais antigos junto a Sagres, às praias viradas a sul, cabo Sardão, ponta da Atalaia e faixa litoral a norte de Sines.