

Chasco-cinzento *Oenanthe oenanthe*

Caiada, Cualvo, Rabialva, Tange-asno, Tanjarro

Estatuto de conservação em Portugal Continental - Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - Distribuição ampla, ocupando quase toda a Europa, Ásia a norte das grandes cadeias montanhosas, Alasca, e nordeste americano (Canadá e Gronelândia). Toda a população é migradora, invernando na África subsaariana e partes do norte de África.

Distribuição em Portugal Continental - Nidifica em zonas serranas da metade norte do território continental, sobretudo acima dos 800 m, em zonas abertas com matos, prados e campos agrícolas, entrecortados com substrato rochoso. Na migração outonal, pode ser encontrado um pouco por todo o território, geralmente em zonas abertas, com pouca ou nenhuma cobertura arbórea. A migração pré-nupcial é menos expressiva.

Fenologia na área de estudo - Migrador de passagem.

Situação na área de estudo - Observou-se exclusivamente durante o período de passagem outonal, podendo-se admitir que também possa ocorrer na migração pré-nupcial, embora seja seguramente muito menos frequente. Em alguns dias da migração outonal é uma das migradoras mais abundantes, sendo particularmente conspícua, sobretudo devido ao hábito de se empoleirar em terrenos abertos, mostrando-se com facilidade.

Ocorre de norte a sul da área considerada, sendo mais abundante em áreas abertas desprovidas de árvores, como são os casos da península da Carrasqueira, Sardanito/Touril (Zambujeira do Mar), Carrapateira e Figueira (Vila do Bispo). Ocorreu também em grandes densidades numa área agrícola a sul dos Foros do Galeado, perto do estuário do Mira. Evita claramente as monoculturas de pinheiros e eucaliptos. Foi observada com maior frequência na segunda visita efetuada durante este período, o que reflete a fenologia da espécie.