

Mochod'orelhas *Otus scops*

Margarida, Mochela

Estatuto de conservação em Portugal – Insuficientemente conhecido.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Típico migrador transaariano, apresenta áreas de nidificação e invernada claramente distintas. Reproduz-se na maior parte do sul e leste da Europa, e ao longo de uma faixa que se estende pela Ásia central. A região de invernada consiste numa larga faixa ao longo de toda a região equatorial africana. Em algumas zonas da bacia mediterrânica é residente.

Distribuição em Portugal Continental – Ocorre como nidificante em várias regiões do país, sendo mais abundante na Beira interior e Trás-os-Montes. No resto do país, distribui-se de forma fragmentada, embora também seja relativamente frequente no sotavento algarvio e zonas serranas da Estremadura. Durante a migração ocorre noutras regiões, como por exemplo no barlavento algarvio.

Fenologia na área de estudo – Migrador de passagem.

Situação na área de estudo – Este rapina noturna apenas ocorre na área de estudo durante a migração outonal, em setembro e outubro. Neste período é regularmente detetado no pinhal de Vale Santo, entre Sagres e o cabo de São Vicente, onde repousa durante o dia, antes de retomar a sua migração noturna para África.