

Felosinha-comum *Phylloscopus collybita*

Bago-d'uva, Felosa-comum, Fuim, Fulecra, Tolinha-das-couves

Estatuto de conservação em Portugal – Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – A sua distribuição enquanto reprodutor abrange praticamente toda Europa e Ásia do norte. Apenas as suas populações do sul das ilhas Britânicas, costa ocidental de França, Penínsulas Ibérica e Itálica, costa da Grécia e Balcãs são residentes, migrando as restantes para África e sul da Ásia.

Distribuição em Portugal Continental – Como reprodutor ocorre de forma muito localizada a norte do Douro. Como invernante possui uma ampla área de distribuição que abrange todo o território continental.

Fenologia na área de estudo – Invernante e migradora de passagem.

Situação na área de estudo – A felosinha-comum possui uma distribuição alargada na área de estudo durante o inverno, estando presente em praticamente todas as quadrículas, frequentando uma grande diversidade de biótopos, incluindo galerias ripícolas, caniçais e outros tipos de vegetação palustre, pinhais, montados, pomares e mosaicos agrícolas com bosquetes ou sebes.

No outono foi detetada sobretudo no final de setembro, registando-se concentrações elevadas nos arrozais da parte norte da área de estudo, mas também em pinhais e mosaicos agrícolas.