

Fura-bucho-do-atlântico *Puffinus puffinus*

Pardela-sombria

Estatuto de conservação em Portugal Continental – Não considerado.

Estatuto de conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Enquanto reprodutor, ocorre no Atlântico Norte, nomeadamente nas zonas insulares (ilhas Britânicas, Faroé, Islândia e Macaronésia) e França. Recentemente estabeleceu-se na costa nordeste do continente americano.

Distribuição em Portugal Continental – É uma espécie exclusivamente marinha, que ocorre ao largo da costa continental portuguesa. É mais frequente ao longo da faixa ocidental, sendo mais rara ao largo da costa sul.

Fenologia na área de estudo – Migrador de passagem.

Situação na área de estudo – Apenas foi registada na passagem outonal, e ao largo do cabo de São Vicente. Esta é a época em que esta espécie é habitualmente observada na região, sobretudo entre finais de agosto e meados de outubro. Admite-se que esteja presente regularmente, mas em números reduzidos, ao largo de toda a faixa litoral considerada, durante o período de passagem pós-reprodutora, embora seja mais visível junto a promontórios como o cabo referido, a ponta da Atalaia (Aljezur), a ponta de Sagres e o cabo Sardão.