

Cartaxo-comum *Saxicola torquatus*

Borra, Caga-estacas, Chasco-preto, Pardinho

Estatuto de Conservação em Portugal Continental - Pouco preocupante.

Estatuto de Conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - De distribuição bastante alargada, ocupa uma faixa extensa que se estende da Europa ocidental ao extremo oriental da Sibéria, e, para sul, em grande parte do continente africano e pela Ásia central. Parte da população é migradora, invernando numa faixa que se estende do norte de África, Médio Oriente e sul da Ásia.

Distribuição em Portugal Continental - Praticamente não há quadrículas do território continental onde não se tenha registado a presença do cartaxo-comum, o mesmo é dizer que tem uma distribuição ampla e é comum. No inverno, chegam alguns exemplares provenientes de latitudes setentrionais da Europa, reforçando os efetivos residentes.

Fenologia na área de estudo - Residente e invernantes.

Situação na área de estudo - É uma das espécies mais abundantes e mais bem distribuídas na área do Atlas, ocorrendo em praticamente todas as quadrículas. Prefere áreas de matos, sebes, mosaico agrícola, dunas, pousios e pastagens, desde que com algumas áreas abertas que podem ser de pequena ou grande dimensão.

Verifica-se um aumento nos valores da abundância no inverno, face às restantes épocas do ano. Significa isto que existe um incremento favorecido pela chegada de exemplares migradores provenientes de outras áreas de latitudes mais setentrionais.

No período outonal ocorreu um incremento acentuado na abundância desta espécie, no extremo sul da área considerada, quando se compara o primeiro período estudado com o segundo (finais de agosto e setembro). Este cenário resume o padrão fenológico das populações migradoras provenientes de outras paragens, e que executam a passagem migratória provavelmente já de setembro em diante.