

Moleiro-do-ártico *Stercorarius pomarinus*

Cágado, Mandrião, Medonho, Moleiro-pomarino

Estatuto de Conservação em Portugal Continental – Não avaliado.

Estatuto de Conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Reproduz-se nas áreas mais setentrionais da Eurásia e América do Norte, invernando em águas intertropicais dos oceanos Pacífico e Atlântico, assim como ao longo das linhas costeiras da Argentina e da Austrália. Algumas aves ocorrem junto à Península Ibérica e noroeste africano, durante o inverno.

Distribuição em Portugal Continental – Trata-se de um migrador de passagem habitual, embora pouco comum, e um invernante escasso, com alguns registos regulares sobretudo ao largo da costa sul. Ocorre mais frequentemente durante a passagem outonal.

Fenologia na área de estudo – Migrador de passagem.

Situação na área de estudo – Muito embora esta espécie tenha apenas sido registada no outono fora dos trabalhos de recolha de dados sistemática, e apenas para a zona do cabo de São Vicente, sabe-se que pode ser observada ao longo de toda a faixa costeira considerada, especialmente junto a promontórios e geralmente quando as condições de mar e vento impliquem a aproximação desta espécie a terra. Trata-se de uma espécie que ocorre quase exclusivamente em meio marinho, existindo escassas observações em zonas interiores, ainda que elas existam e próximas da linha de costa.

Conhecem-se registos de aves invernantes ao longo da faixa costeira portuguesa, sobretudo a sul do cabo da Roca, assim como da passagem primaveril, pelo que se admite que este moleiro deverá estar presente na área considerada também nestas épocas.