

Maçarico-bastardo *Tringa glareola*

Estatuto de Conservação em Portugal Continental – Não avaliado.

Estatuto de Conservação mundial – Pouco preocupante.

Distribuição mundial – Apresenta uma distribuição holártica na época de reprodução, ocupando uma larga faixa que se estende da península escandinava à Sibéria oriental. No inverno, distribui-se pela África subsaariana, sudeste asiático e subcontinente indiano, e Australásia. Algumas populações invernam também no noroeste de África, vale do Nilo e península arábica.

Distribuição em Portugal Continental – Ocorre sobretudo nas principais zonas estuarinas do território, assim como em campos de arroz alagados, durante o verão e outono. Algumas aves também são observadas no período de inverno, nos mesmos habitats. Os estuários do Tejo e Sado, e arrozais adjacentes, e o sapal de Castro Marim, são as principais áreas de ocorrência desta limícola.

Fenologia na área de estudo – Migrador de passagem.

Situação na área de estudo – O maçarico-bastardo é uma limícola de ocorrência localizada e rara na área de estudo. Observou-se apenas no inverno e no período de migração outonal, em locais como o estuário do Sado e arrozais adjacentes da Comporta, na lagoa de Santo André e em campos agrícolas alagados perto de Porto Covo. É uma espécie que prefere locais de águas paradas, como arrozais e campos agrícolas encharcadas.